



Combi-mix

Endikasyon (belirti):

Kuşlarda koksidiyoz ve atoksoplazmoz (lankesterella)

Semptomları:

- İştah kaybı
- Tüy dökülmesi
- Sulu, sıvılaştırmış dışkı
- Kirli kış tüyleri
- Karaciğer büyümesi
- Bağırsak şişmesi

Dozaj

Koksidiyoz dozajı: Kafes kuşları, kanaryalar: 1g/200 ml içme suyu (5 g/1 l içme suyu); 2 gün sonra tedaviyi tekrar ediniz.

Atokzoplazmoz (Lankesterella) dozajı: Kafes kuşları, kanaryalar: 1g/400 ml içme suyu (5g/2 l içme suyu), ilk tüy değişimi sonrasında kadar besleme süresince devamlı olarak uygulanacaktır. Ölçüm kaşığı 1+ 5 g.



Etkileşim(ler)i: Bilinmemektedir.

Kontraendikasyon(lar) (tedavinin uygun olmadığı hal): aşırı dozda kullanımı.

Kullanım önerisi:

Hasta kuşları ayırınız (sıcaklık 28-33 °C, karartılmış ışıkta).

Hasta kuşları tedavi ederken, diğer kuşlara da bu hastalığı önleyici tedaviler uygulayınız.

Kuşların, tavsiye edilen miktarlarda tedavi almasını ve böylece ilaçsız yiyecek ya da su alımının önlenmesini güvence altına alınız.

Tedavi süresince glukoz ve MULTIVIT MIX'i enjekte ediniz.

Ciddi durumlar için, genişletilmiş tedavi önerilmektedir.

Kuşların tedavi edildiği yerin yeterli oranda dezenfekte edildiğinden emin olunuz.

Hızlı bir değişim gerçekleşmezse, bir uzmana başvurunuz.

NOTLAR: KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUNUZ.

Kuru, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan yerlerde, 0-30°C arasındaki sıcaklıkta saklayınız.

Raf ömrü ilk açıldığı tarihten itibaren bir (1) yıldır.

Seri numarası ve son kullanma tarihi için pakete bakınız.

Ellerinize doğrudan teması önleyiniz.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Yalnızca hayvan tedavisinde kullanılmaktadır. İnsan tüketimi için gıda üretimine yönelik hayvanlar için kullanılmamaktadır.

Boş paketi ve artan ürünü ev artıklarından atınız.

Bu veteriner ilacı küçük hayvan muafiyet şemasına bağlı olarak pazarlanmaktadır.

İçindekiler:

% 5 Sülfaklorpidazin Sodyum, 100 gr'a kadar pasif içerikler