



Intestinal

Endikasyon (belirti):

Kuşlarda Stafilokok, Streptokok ve Enterekok gibi bakteriyel gastrointestinal enfeksiyonlar.

Semptomlar:

- Davranış ve görünüşte açık bir değişim
- Tüylerin karışması ve dökülmesi
- Kırmızı sulanmış gözler, nazal boşaltım (burun akması)
- İshal
- Alışılmadık ya da zor nefes alma
- İştahın azalması ve düşük tüneklerde oturma



Dozaj

Normal bir tedavi olarak: 3-5 gün süresince 2 L ılık içme suyuna 5 gr ekleyiniz.

Ciddi enfeksiyonlar olması halinde: Tedaviyi birbirini takip eden 5-7 süresince devam ettiriniz.

Birkaç gün sonra gerekirse kür tekrarlanabilir. Ölçüm kaşığı 1+5 g.



Etkileşim(ler)i: Bilinmemektedir.

Kontraendikasyon(lar) (tedavinin uygun olmadığı hal): aşırı dozda kullanımı.

Kullanım önerisi:

Hasta kuşları ayırınız (sıcaklık 28-33 °C, karartılmış ışıkta).

Hasta kuşları tedavi ederken, diğer kuşlara da bu hastalığı önleyici tedaviler uygulayınız.

Kuşların, tavsiye edilen miktarlarda tedavi almasını ve böylece ilaçsız yiyecek ya da su alımının önlenmesini güvence altına alınız.

Tedavi süresince glukoz ve MULTIVIT MIX'i enjekte ediniz.

Ciddi durumlar için, genişletilmiş tedavi önerilmektedir.

Kuşların tedavi edildiği yerin yeterli oranda dezenfekte edildiğinden emin olunuz.

Hızlı bir değişim gerçekleşmezse, bir uzmana başvurunuz.

NOTLAR: KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUNUZ.

Kuru, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan yerlerde, 0-30°C arasındaki sıcaklıkta saklayınız.

Raf ömrü ilk açıldığı tarihten itibaren bir (1) yıldır.

Seri numarası ve son kullanma tarihi için pakete bakınız.

Ellerinize doğrudan teması önleyiniz.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Yalnızca hayvan tedavisinde kullanılmaktadır. İnsan tüketimi için gıda üretimine yönelik hayvanlar için kullanılmamaktadır.

Boş paketi ve artan ürünü ev artıklarından atınız.

Bu veteriner ilacı küçük hayvan muafiyet şemasına bağlı olarak pazarlanmaktadır.

İçindekiler:

% 4 Trimetoprim, % 20 Sülfadiazin Sodyum, 100 gr'a kadar pasif içerikler.