



Coli Stop **Extra Strong**

E-Coli, Paratyphoid, Streptococcus, Staphylococcus
и бактериални инфекции

Симптоми:

Загуба на апетит, надута гуша, загуба на телло,
повръщане, кафяво-зелени или мазни изпражнения,
внезапна смърт.

Дозировка

100 гр. ПРАХ

Профилактично: 1 мерителна лъжица (=5 гр.) на 2 литра вода,
в продължение на 1 или 2 дни, на всеки 2 седмици.

Лечебно: 1 мерителна лъжица (=5гр.) на 2 литра
вода, в продължение на 5-7 последователни дни.
Това лечение може да бъде повторено при необходимост
няколко дни по-късно.

Може да се дава заедно с: Carelyt, Glucovit, Caresol,
Caremin, Carechol, Energy Mix, Herbal Care, Multivitamin

Дозировка

50 бр. ТАБЛЕТКИ

Профилактично: 1 таблетка на гълъб (400-500 гр. телесно тегло)
за 1-2 последователни дни.

Лечебно: 1 таблетка на гълъб (400-500 гр. телесно тегло) за
3-5 последователни дни, или по предписание на ветеринар.

Може да се дава заедно с: Carelyt, Glucovit, Caresol,
Caremin, Carechol, Energy Mix, Herbal Care, Multivitamin