



# Coli Stop

## Extra Strong

*E-coli, Paratyphus, Streptokokken, Staphylokokken*

### Symptome

Appetitverlust, aufgeblähter Hals, Gewichtsverlust, Erbrechen, braun-güne oder fettige Stühle, plötzlicher Tod.

#### Dosierung

**100 g PULVER**

**Prophylaxe:** 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen. Empfohlen wird nach dem Wettbewerbttag zu beginnen.

**Als Heilmittel:** 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese Behandlung kann ein paar Tage später bei Notwendigkeit wiederholt werden.

**Zusammensetzung:** Streptomycine Sulfate 13,9%, Neomycine Sulfate 4%, Colistine Sulfate 2%. Inactive ingredients q.s. to 100 g.

#### Dosierung

**50 TABLETTEN**

**Vorbeugend:** 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 1-2 aufeinanderfolgende Tage

**Heilung:** 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes

**Zusammensetzung:** Neomycine sulfat 5,0 mg/g ; Streptomycine sulfat 17,4 mg/g ; Colistine sulfat 2,5 mg/g