



Coli Stop

Extra Strong

E-Coli, Παρατυφοειδής, Στρεπτόκοκκος, Σταφυλόκοκκος και γενικές βακτηριακές λοιμώξεις.

Συμπτώματα

Απώλεια όρεξης, χαμηλή εκκένωση καλλιερειών, απώλεια βάρους, εμετός καφέ ή πράσινα υδαρή ή γλοιώδη περιτώματα, ξαφνικός θάνατος.

Δοσολογία

Πρόληψη: 1 μετρημένη κουταλιά (=5g) για 2 λίτρα πόσιμου νερού κατά τη διάρκεια 1 ή 2 μέρες κάθε 2 εβδομάδες, κατά προτίμηση στην αρχή της μέρας μετά τον αγώνα.

Ως Θεραπεία: 1 μετρημένη κουταλιά (=5g) για 2 λίτρα πόσιμου νερού, κατά τη διάρκεια 5-7 διαδοχικών ημερών. Η θεραπεία ενδέχεται να επαναληφθεί εάν κριθεί απαραίτητο μετά από μερικές ημέρες.

Περιέχει: Streptomycine Sulfate 13,9%, Neomycine Sulfate 4%, Colistine Sulfate 2%. Inactive ingredients q.s. to 100 g.

100 g ΣΚΟΝΗ

Δοσολογία

Προληπτικά: 1 δισκίο ανά περιστερί (400-500 g σωματικού βάρους) για 1-2 διαδοχικές ημέρες.

Ως Θεραπεία: 1 δισκίο ανά περιστερί (400-500 g σωματικού βάρους) για 3-5 διαδοχικές ημέρες ή όπως ορίζει η συνταγή γιατρού.

Περιέχει: Neomycine sulfate 5,0 mg/g ; Streptomycine sulfate 17,4 mg/g ; Colistine sulfate 2,5 mg/g

50 τμχ. ΔΙΣΚΙΑ