



Coli Stop **Extra Strong**

Javallat

E-Coli, Paratyphus, Streptococcus, Staphylococcus és egyéb bakteriális fertőzések esetén.

Tünetek:

Étvágytalanság, lassú emésztés, súlycsökkenés, hányás, barnás zöld, vizes, vagy nyálkás ürülék, hirtelen halál.

Adagolás

100 g POR

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez, hetente 1 vagy 2 napig, minden héten lehetőleg a versenyt követő napon.

Gyógykezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon.

Ezt a gyógymódot néhány nap elteltével meg lehet ismételni.

A Coli Stop vízben oldódó por, amelyet a takarmányba keverve is adhatuk.

Mérőkanál 1 + 5 g együtt.

Hatóanyagok: Streptomycin-szulfát 13,9%, neomicin-szulfát 4%, kolisztin-szulfát 2%. Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírta.

Hatóanyagok: Neomicin-szulfát 5,0 mg / g; Streptomycin-szulfát 17,4 mg / g; Kolistin-szulfát 2,5 mg / g