



Coli Stop **Extra Strong**

E-coli, Paratyphoid, Streptococcus, Staphylococcus i ogólnie infekcje bakteryjne

Objawy:

Utrata apetytu, obrzęk szyi, utrata wagi, wymioty, brązowo-zielone lub tłuste zielonych odchody, nagła śmierć.

Dawkowanie

100 g PROSZEK

Profilaktycznie: 1 miarkę (=5g) na 2 l wody, w ciągu 1 lub 2 dni, co 2 tygodnie. Najlepiej zacząć po dniu wyścigu.

Podczas choroby: 1 miarkę (=5 g.) na 2 l wody, w ciągu 5-7 dni kolejnych.

Leczenie można powtórzyć w razie potrzeby. Coli Stop jest rozpuszczalnym w wodzie proszkiem, który można podawać z pożywieniem. (w karmniku)

W komplecie zawarta miarka 1+5g.

Skład: Streptomycine Sulfate 13,9%, Neomycine Sulfate 4%, Colistine Sulfate 2%. Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dawkowanie:

50 TABLETKI

Profilaktycznie: 1 tabletkę na gołębia (400-500g. ciężaru ciała) na 1-2 dni kolejnych.

Podczas choroby: 1 tabletkę na gołębia (400-500g. ciężaru ciała) na 3-5 dni kolejnych lub lub na receptę weterynarza .

Skład: Neomycine sulfate 5,0 mg/g ; Streptomycine sulfate 17,4 mg/g ; Colistine sulfate 2,5 mg/g