



Coli Stop

Indikacije:

E-Koli, Paratifuid, Streptokoka, Stafilokoka i bakterijalne infekcije.

Simptomi:

Gubitak apetita, sporo izbacivanje izmeta, gubitak težine, povraćanje, braon/zeleni vodeni proliv, iznenadna smrt.

Doziranje:

Prevenција: 1 merica (5g) na 2L pijaće vode, 1 ili 2 dana u nizu, na svake 2 nedelje, poželjno početi na dan posle trke.

Kao tretman: 1 merica (5g) na 2L pijaće vode, 5-7 dana u kontinuitetu.

Upotreba leka se može ponoviti posle nekoliko dana ako je neophodno.

Dobro promešati pre upotrebe.

Coli Stop je prah rastvorljiv u vodi, ali se takođe može davati kroz hranu.

Merica 1+5 g je uključena.



Saveti kako upotrebljavati:

- Stavite bolesnu pticu u karantin.
- Tretirajte sve vaše ptice, ne samo bolesne.
- Pomešajte potrebnu dozu kroz vodu ili hranu za jedan dan konzumiranja, ne za više, zbog svežine rastvora.
- Osigurajte da pticama bude dostupna samo voda koja sadrži lek tokom tretmana.
- Posle tretmana Coli Stopom, omogućite vašoj ptici dozu Multivitamina (dan posle zadnjeg dana upotrebe leka)
- Svake nedelje upotrebljavajte Multivitamin posle lečenja.
- Dezinfikujte golubarnik ili mesto gde su ptice.
- Ne upotrebljavajte lek na dan pakovanja ili dan ispred trke.

Napomena: Pročitajte pre upotrebe.

- Čuvati na suvom, tamnom mestu, van domašaja Sunčevih zraka, na temperaturi od 0-30 stepeni.
- Rok trajanja posle otvaranja poklopca: 1 godina.
- Datum proizvodnje i isteka je utisnut na pakovanju.
- Izbegavajte kontakt rukama sa lekom..
- Čuvati van domašaja dece.
- Interakcija: nije poznata. Kontra indikacije: predoziranje.
- Samo za životinjsku upotrebu. Ne za ljude i životinje koje su za prehranu ljudi.
- Odlazite prazna pakovanja u za na to predviđena mesta.

Sastav:

Streptomycin Sulfat 13,9%, Neomicin Sulfat 4%, Kolistin Sulfat 2%. Neaktivni sastojci q.s. do 100 g.