



Combi Mix 4 in 1

• •

Indikacije:

Combi mix 4 u 1 je veoma pogodan za tretman **Trihomonijaze, Heksamitioze, Kokcidioze i šlajma u grlu vaše ptice**. Tokom takmičarske sezone, vrlo je važno da vam ptice budu u optimalnom stanju, tako da ništa ne stoji na njihovom putu da prikažu vrhunske rezultate. Combi mix 4 u 1 vam pomaže da dostignete to. Može se upotrebljavati i preventivno i za lečenje već obolelih ptica.

Simptomi:

Manjak kondicije, loše varenje, vodenkasti izmet, grlo vaše ptice će sadržati više šlajma nego inače i biće crvene boje, male bele do žućkastih fleka unutar kljuna, respiratorni problemi.



Doziranje:

Prevencija: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 1 ili 2 dana u nizu, na svake 2 nedelje, poželjno na dan posle trke početi.

Kao tretman: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 5-7 dana u kontinuitetu.

Upotreba leka se može ponoviti posle nekoliko dana ako je neophodno.

Dobro promešati pre upotrebe.

Combi-Mix je prah rastvorljiv u vodi, ali se takođe može davati kroz hranu.

Merica 1+5 g je uključena.



Saveti kako upotrebljavati:

- Stavite bolesnu pticu u karantin.
- Tretirajte sve vaše ptice, ne samo bolesne.
- Pomešajte potrebnu dozu kroz vodu ili hranu za jedan dan konzumiranja, ne za više, zbog svežine rastvora.
- Osigurajte da pticama bude dostupna samo voda koja sadrži lek tokom tretmana.
- Posle tretmana Combi-mixom, omogućite vašoj ptici dozu Multivitamina (dan posle zadnjeg dana upotrebe leka)
- Svake nedelje upotrebljavajte Multivitamin posle lečenja.
- Dezinfikujte golubarnik ili mesto gde su ptice.
- Ne upotrebljavajte lek na dan pakovanja ili dan ispred trke.

Napomena: Pročitajte pre upotrebe.

- Čuvati na suvom, tamnom mestu, vam domaćaja Sunčevih zraka, na temperaturi od 0-30 stepeni.
- Rok trajanja posle otvaranja poklopca: 1 godina.
- Datum proizvodnje i isteka je utisnut na pakovanju.
- Izbegavajte kontakt rukama sa lekom..
- Čuvati van domaćaja dece.
- Interakcija: nije poznata. Kontra indikacije: predoziranje.
- Samo za životinjsku upotrebu. Ne za ljude i životinje koje su za prehranu ljudi.
- Odlažite prazna pakovanja u za na to predviđena mesta.

Sastav:

Ampronilum 10%, Seknidazol 15% , neaktivni sastojci q.s. do 100 g.

