



Δοσολογία

Πρόληψη: 1 μετρημένη κουταλιά (=5g) για 2 λίτρα πόσιμου νερού κατά τη διάρκεια 1 ή 2 μέρες κάθε 2 εβδομάδες, κατά προτίμηση στην αρχή της ημέρας μετά τον αγώνα.

Ως θεραπεία: 1 μετρημένη κουταλιά (=5g) για 2 λίτρα πόσιμου νερού, κατά τη διάρκεια 5-7 διαδοχικών ημερών. Η θεραπεία ενδέχεται να επαναληφθεί εάν κριθεί απαραίτητο μετά από μερικές μέρες.

Περιέχεται: Furaladone HCl 12%, Metronidazole 20%, Chlortetracycline HCl 10%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

100 g ΣΚΟΝΗ

50 τμχ. ΔΙΣΚΙΑ

Συμπτώματα

Απώλεια βάρους, γλοιώδη πράσινα περιττώματα, προημένες, αρθρώσεις ποδιών και φτερών, άγονα αυγά, συστροφή λαυρού – μερικές φορές στο πλάι, ασθένεια νεαρών πουλιών, ξαφνικός θάνατος.

Δοσολογία

Προληπτικά: 1 δισκίο ανά περιστέρι (400-500 g σωματικού βάρους) για 1-2 διαδοχικές ημέρες.

Ως θεραπεία: 1 δισκίο ανά περιστέρι (400-500 g σωματικού βάρους) για 3-5 διαδοχικές ημέρες ή όπως ορίζει η συνταγή γιατρού.

Περιέχεται: Furaladone HCl 75 mg/g ; Ronidazole 25 mg/g