



General Care

• •

Indikacije:

Canker (Trihomonijaza, Heksamitioza), Paratifuid, E-koli i bakterijalne infekcije.

Simptomi:

Gubljenje težine i generalno loše stanje ptice, izmet je zelen i ljugav. Noge i zglobovi krila su natečeni, jaja su neplodna, ponekada ptice krive vrat u stranu, bolest mladih ptica, iznenadna smrt.



Doziranje:

Prevencija: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 1 ili 2 dana u nizu, na svake 2 nedelje, poželjno početi na dan posle trke.

Kao tretman: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 5-7 dana u kontinuitetu.

Upotreba leka se može ponoviti posle nekoliko dana ako je neophodno.

Dobro promešati pre upotrebe.

General Care je prah rastvorljiv u vodi, ali se takođe može davati kroz hranu.

Merica 1+5 g je uključena.



Saveti kako upotrebjavati:

- Stavite bolesnu pticu u karantin.
- Tretirajte sve vaše ptice, ne samo bolesne.
- Osigurajte da pticama bude dostupna samo voda koja sadrži lek tokom tretmana.
- Nemojte давати никакве dodatke ishrani koji sadrže kalcijum, soli, gritove tokom tretmana.
- Posle tretmana General Care-om, omogućite vašoj ptici dozu Multivitamina (dan posle zadnjeg dana upotrebe leka)
- Svake nedelje upotrebjavajte Multivitamin posle lečenja.
- Dezinfikujte golubarnik ili mesto gde su ptice.
- Ne upotrebjavajte lek na dan pakovanja ili dan ispred trke.

Napomena: Pročitajte pre upotrebe.

- Čuvati na suvom, tamnom mestu, vam domaćaja Sunčevih zraka, na temperaturi od 0-30 stepeni.
- Rok trajanja posle otvaranja poklopca: 1 godina.
- Datum proizvodnje i isteka je utisnut na pakovanju.
- Izbegavajte kontakt rukama sa lekom..
- Čuvati van domaćaja dece.
- Interakcija: nije poznata. Kontra indikacije: upotreba zajedno sa Bromheksinom i predoziranje.
- Samo za životinjsku upotrebu. Ne za ljude i životinje koje su za prehranu ljudi.
- Odlažite prazna pakovanja u za na to predviđena mesta.

Sastav:

Furaltadon HCl 12%, Metronidazole 20%, Hlortetraciklin HCl 10%, neaktivni sastojci q.s. do 100 g.