



Orni Super Mix **Extra Strong**



Indikacije:

Ornitoza, Mikoplazmoza, Canker i problemi respiratornih organa.

Simptomi:

Ptice čupaju sebi perje, češaju glavu, crveno grlo, zevanje, prljave nozdrve, otekle glave, suzne izlučevine iz očiju, slinavljenje, kod mladih golubova se dešava i upaljen treći kapak.

Doziranje:

Prevenција: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 1 ili 2 dana u nizu, na svake 2 nedelje, poželjno na dan posle trke početi.

Kao tretman: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 5-7 dana u kontinuitetu.

Upotreba leka se može ponoviti posle nekoliko dana ako je neophodno.

Dobro promešati pre upotrebe.

Orni Special je prah rastvorljiv u vodi, ali se takođe može davati kroz hranu.

Merica 1+5 g je uključena.



Saveti kako upotrebljavati:

- Stavite bolesnu pticu u karantin.
- Tretirajte sve vaše ptice, ne samo bolesne.
- Pomešajte potrebnu dozu kroz vodu ili hranu za jedan dan konzumiranja, ne za više, zbog svežine rastvora.
- Osigurajte da pticama bude dostupna samo voda koja sadrži lek tokom tretmana.
- Posle tretmana Orni Specialom, omogućite vašoj ptici dozu Multivitamina (dan posle zadnjeg dana upotrebe leka)
- Svake nedelje upotrebljavajte Multivitamin posle lečenja.
- Dezinfikujte golubarnik ili mesto gde su ptice.
- Ne upotrebljavajte lek na dan pakovanja ili dan ispred trke.

Napomena: Pročitajte pre upotrebe.

- Čuvati na suvom, tamnom mestu, van domašaja Sunčevih zraka, na temperaturi od 0-30 stepeni.
- Rok trajanja posle otvaranja poklopca: 1 godina.
- Datum proizvodnje i isteka je utisnut na pakovanju.
- Izbegavajte kontakt rukama sa lekom..
- Čuvati van domašaja dece.
- Interakcija: nije poznata. Kontra indikacije: upotreba zajedno sa Furaltadonom i predoziranje.
- Samo za životinjsku upotrebu. Ne za ljude i životinje koje su za prehranu ljudi.
- Odlazite prazna pakovanja u za na to predviđena mesta.

Sastav:

Doksiklin Hiklat 6%, Spiramicin Adipat 10%, Metronidazol 10%, Bromheksin HCl 2%, neaktivni sastojci q.s. do 100 g.