

Ronidazole

Javallat

A Ronidazole 10% egy olyan galambok részére kifejlesztett termék, amely különösen hatékony a Trichomonasok és Hexamiták által okozott fertőzésekkel szemben. (Sárgagomb betegség) A versenyszezon során rendszeresen kezelni kell ezeket a fertőzéseket. A Hexamiták által okozott súlyos bélfertőzésben szenvedő fiatal madarak hajlamosabbak a kellemetlen E-coli fertőzésre. Nagyon fontos a galambjaink egészségvédelme, beleértve a fiatal állatokat is.

Tünetek

Az általános állapot romlása, emésztési rendellenességek, megváltozott állagú széklet, szájüreg, garat nyelőcső begy nyálkahártyájának a gyulladás valamint, ornitózisos szövődmények. Apró, a fehértől sárgásig színig terjedő elváltozott területek a szájüregben



100 g POR

Adagolás:

Megelőzés: 2 mérőkanál (= 2 g) / 1 liter ivóvíz 1-2 napig 2 hetente megismételve, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve.

Kezelésként a versenyszezon során: 2 mérőkanál (= 2 g) / 1 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napig.

Ezt a gyógymódot néhány nap elteltével meg lehet ismételni.

Használat előtt alaposan keverje meg!

A Ronidazol vízoldható por, amely a takarmánnyal összekeverve is használható. Mérőkanál 1 + 5 g.

Hatóanyag: Ronidazol 10%, inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

50 TABLETTA

Adagolás:

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400–500 g testtömeg) 3–5 egymást követő napon, vagy az állatorvos előírja.

Hatóanyag: Ronidazol 150 mg / g