

Salmo-Stop ^{Extra Strong}

Salmonellen , E-coli und bakterielle Infektionen

Symptome:

Durchfall (grüne Diarrhoe und bei einigen Vögeln mit Erbrechen), langsames Trocknen des Halses, Infektionsarthritis (Hinken oder „gefallener“ Flügel), Unterhautabszess (gewöhnlich unter den Augen, mit der Form von kleinen, gelben und harten Eiterbeutelchen), Fruchtlosigkeit, plötzlicher Tod.


Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, empfohlen wird Beginn nach dem Wettbewerbttag.

Heilung: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser, im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese Arznei kann bei Notwendigkeit nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Furaltadone HCl 12,5%, Chlortetracycline HCl 12,5%, Chloramphenicol 8%, Wirkstoffe genügend für 100 g



Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Chlortetracycline HCl 78 mg/g ; Furaltadone HCl 80 mg/g ; Chloramphenicol 50 mg/g