Salmo-Stop Strong

Σαλμονέλα (παρατυφοειδής) E-coli και γενικές βακτηριακές λοιμώξεις

Συμπτώματα

Διάρροια (πράσινού χρώματος, σε μερικά πουλιά με τάση εμετού), αργή καμπυλότητα λαιμού, λοιμώδη αρθρίτιδα(πεσμένα φτερά), υποδόρια αποστήματα (συνήθως κάτω από τα μάτια, σε μορφή μικρών κίτρινων και σκληρών πυωδών σάκων, ξαφνικός θάνατος.

100 g XKONH





Δοσολογία

Πρόληψη: 1 μετρημένη κουταλιά (=5g) για 2 λίτρα πόσιμου νερού κατά τη διάρκεια 1 ή 2 μέρες κάθε 2 εβδομάδες, κατά προτίμηση στην αρχή της μέρας μετά τον αγώνα.

Ως θεραπεία: 1 μετρημένη κουταλιά (=5g) για 2 λίτρα πόσιμου νερού, κατά τη διάρκεια 5-7 διαδοχικών ημερών. Η θεραπεία ενδέχεται να επαναληφθεί εάν κριθεί απαραίτητο μετά από μερικές μέρες.

Περιέχει: Furaltadone HCl 12,5%, Chlortetracyline HCl 12,5%, Chloramphenicol 8%. Inactive ingredients q.s. to $100\,\mathrm{g}$

Δοσολογία

Προληπτικά: 1 δισκίο ανά περιστέρι (400-500 g σωματικού βάρους) για 1-2 διαδοχικές ημέρες.

Ως θεραπεία: 1 δισκίο ανά περιστέρι (400-500 g σωματικού βάρους) για 3-5 διαδοχικές ημέρες ή όπως ορίζει η συνταγή γιατρού.

Περιέχει: Chlortetracycline HCl 78 mg/g ; Furaltadone HCl 80 mg/g ; Chloramphenicol 50 mg/g

50 τμχ. ΔΙΣΚΙΑ