

Salmo-Stop Extra Strong

Javallat:

Szalmonella (paratífusz), E-coli és egyéb bakteriális fertőzések esetér

Tünetek:

Zöld színű, híg állagú széklet (hasmenés), gyakori hányás, lassú emésztés, fertőzött izületi gyulladás (sántaság vagy lógó szárny), bőr alatti tályogok (általában a száj alatt kialakult kis duzzanat, amely kemény, sárga és száraz gennyet tartalmaz), meddőség, hirtelen elhullás.



Adagolás

100 g POR

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 1-2 napig 2 hetente megismételve, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve. Gyógykezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon.

A gyógykezelés néhány nap elteltével megismételhető.

Használat előtt alaposan keverje össze!

A Salmo Stop egy vízben oldódó por, amely a takarmánnyal összekeverve is adható. Mérőkanál 1 + 5 g

Hatóanyagok: Furaltadone HCl 12,5%, Chlortetracycline HCl 12,5%, Chloramphenicol 8%. Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig

Adagolás

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tablettá galambként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tablettá galambként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírja.

Hatóanyagok: Chlortetraciklin-HCl 78 mg / g; Furaltadone HCl 80 mg / g; Chloramfenikol 50 mg / g;