



# Salmo-stop

## Indikacije:

Salmonela (paratifoid), E-Koli i bakterijalne infekcije.

## Simptomi:

Dijareja (zelena dijareja i neke ptice će povraćati), sporo izbacivanje izmeta, infektivni artritis (hromost ili pad krila), otok ispod oka koji sadrži žuti suvi gnoj, neplodnost, iznenadna smrt.

## Doziranje:

Prevencija: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 1 ili 2 dana u nizu, na svake 2 nedelje, poželjno početi na dan posle trke.

Kao tretman: 1 merica (5grama) na 2 litra pijaće vode, 5-7 dana u kontinuitetu.

Upotreba leka se može ponoviti posle nekoliko dana ako je neophodno.

Dobro promešati pre upotrebe.

Salmo Stop je prah rastvorljiv u vodi, ali se takođe može davati kroz hranu.

Merica 1+5 g je uključena.



## Saveti kako upotrebjavati:

- Stavite bolesnu pticu u karantin.
- Tretirajte sve vaše ptice, ne samo bolesne.
- Osigurajte da pticama bude dostupna samo voda koja sadrži lek tokom tretmana.
- Nemojte давати никакве dodatke ishrani koji sadrže kalcijum, soli, gritove tokom tretmana, takodje i preparate koji sadrže mlečne proizvode.
- Posle tretmana Salmo-Stopom, omogućite vašoj ptici dozu Multivitamina (dan posle zadnjeg dana upotrebe leka)
- Svake nedelje upotrebjavajte Multivitamin posle lečenja.
- Dezinfikujte golubarnik ili mesto gde su ptice.
- Ne upotrebjavajte lek na dan pakovanja ili dan ispred trke.

## Napomena: Pročitajte pre upotrebe.

- Čuvati na suvom, tamnom mestu, vam domaćaja Sunčevih zraka, na temperaturi od 0-30 stepeni.
- Rok trajanja posle otvaranja poklopca: 1 godina.
- Datum proizvodnje i isteka je utisnut na pakovanju.
- Izbegavajte kontakt rukama sa lekom..
- Čuvati van domaćaja dece.
- Interakcija: nije poznata. Kontra indikacije: upotreba zajedno sa Bromheksinom i predoziranje.
- Samo za životinjsku upotrebu. Ne za ljudе i životinje koje su za prehranu ljudi.
- Odlažite prazna pakovanja u za na to predviđena mesta.

## Sastav:

Furaltadon HCl 12,5%, Hlortetraciklin HCl 12,5%, Hloramfenikol 8%. Neaktivni sastojci k.s. do 100grama.