



Worm Care Extra Strong

Μολύνσεις και ενοχλήσεις του τριχώματος των περιστεριών/*Capillarias spp* and *Ascaridia spp*/

Συμπτώματα

Τα πουλιά χάνουν βάρος. Τα έντονα μολυσμένα περιστέρια συνήθως εμφανίζουν γενικές διαταραχές και είναι απρόσωπα με θαμπό και φουσκωτό τρίχωμα, περιττώματα ποικίλης συνέπειας.

Δοσολογία

5 g. για 2 λίτρα πόσιμου νερού, (40 περιστέρια), 1 ή 2 ημέρες. Τα περιστέρια δεν πρέπει να αποστραγγίζονται κατά την εκτροφή των νέων ή κατά τη διάρκεια της κύριας αλλαγής φτερών, επαναλάβετε τη θεραπεία μετά από 10-12 ημέρες.

Το Worm-Stop είναι υδροδιαλυτή σκόνη η οποία μπορεί να δοθεί μαζί με τη τροφή.

Περιέχει:

Levamisole HCl 16%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

100 g ΣΚΟΝΗ

Δοσολογία

1 δισκίο ανά περιστέρι (400-500 σωματικού βάρους) για 1 ημέρα. Επαναλάβετε τη θεραπεία μετά από 10-12 ημέρες.

Περιέχει: Flubendazole 66,7 mg/g

50 τμχ. ΔΙΣΚΙΑ